


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА)

ГЛЮКОЗА, таблетки жевательные 2000 мг

Общая характеристика.

Международное непатентованное название. Glucose.

Описание. Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические, с риской, с фаской.

Состав. Каждая таблетка содержит глюкозы - 2000 мг;

вспомогательные вещества: картофельный крахмал, тальк, кальция стеарат.

Лекарственная форма. Таблетки жевательные.

Фармакотерапевтическая группа. Питательные вещества. Углеводы. Глюкоза.

Код АТХ: V06DC01.

Фармакологические свойства. Фармакодинамика. Глюкоза – вещество, которое влияет на обменные процессы, принимает участие в углеводном и энергетическом обмене, служит источником энергии в организме; улучшает противотоксическую функцию печени, повышает работоспособность сердечной мышцы и выделительную функцию почек.

Фармакокинетика. Лекарственное средство хорошо всасывается в пищеварительном тракте, с током крови разносится во все органы и ткани. Усваивается полностью организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком). Основными путями метаболизма глюкозы является гликолиз и аэробное окисление с образованием углекислого газа и воды с высвобождением АТФ и других макроэнергетических соединений.

Показания к применению. Гипогликемия.

Способ применения и дозы. Принимают внутрь по ½ - 1 таблетке (1000 – 2000 мг) в сутки. Доза и курс лечения определяется врачом в зависимости от характера и течения гипогликемии.

Побочное действие. При употреблении в рекомендуемых дозах побочных реакций не наблюдается.

Противопоказания. Гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), сахарный диабет, повышенная чувствительность (аллергия) к компонентам лекарственного средства, непереносимость глюкозы и галактозы или мальабсорбция галактозы (галактоземия), детский возраст до 6 лет.

Передозировка. Симптомы: тошнота, вздутие живота, понос.

Лечение: прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности. Лекарственное средство не рекомендуют принимать больным с пониженной толерантностью к глюкозе.

Применение при беременности и в период лактации. Дети. При употреблении лекарственного средства при беременности и в период лактации, а также детям, необходимо соблюдать дозирование и длительность курса приема, назначенные врачом.

Влияние на способность вождения автомобилем и работу с движущимися механизмами. Не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Случаев несовместимости с лекарственными средствами не выявлено.

Условия хранения и срок годности. В защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 15 таблеток в упаковке полимерной.

Информация о производителе.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

