


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА)

АЛТЕЙ

Описание. Густая, однородная жидкость светло-коричневого цвета с характерным для растительного экстракта алтея запахом, сладкого вкуса. Допускается в процессе хранения образование осадка и/или помутнение, не влияющее на качество лекарственного средства.

Лекарственная форма. Сироп.

Состав 200 мл. *Активные компоненты:* Экстракт алтея жидкий водный (1:10) - 98,63 г; *вспомогательные вещества:* фруктоза, калия сорбат (Е 202), лимонная кислота моногидрат.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. R05CA05.

Фармакологическое действие.

Фармакодинамика. Фармакологические свойства лекарственного средства обусловлены наличием слизей (смеси пентозанов и гексозанов), пектиновых веществ, крахмала и других полисахаридов коллоидного характера.

Лекарственное средство обладает противовоспалительным, обволакивающим и противокашлевым действием.

Полисахариды, входящие в состав экстракта корня алтея, оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, уменьшают воспаление и раздражение слизистых оболочек, способствуют уменьшению кашлевого рефлекса и связанного с ним сухого кашля.

Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры не изучены, так как лекарственные средства растительного происхождения содержат различные биологически активные вещества.

Показания к применению.

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит, бронхит), сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозы.

Внутрь, 3 раза в день, разбавляя в теплом чае:

- детям от 3 до 6 лет по 1 чайной ложке (5 мл),
- детям старше 6 лет по 1 десертной ложке (10 мл),
- взрослым по 1 столовой ложке (15 мл).

Перед употреблением взбалтывать.

Продолжительность приема лекарственного средства определяется врачом.

Побочные действия.

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в инструкции по применению, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства; не должен применяться при врожденной непереносимости фруктозы; детский возраст до 3-х лет.

Передозировка.

Случаи передозировки не известны.

Особые указания.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (появляются нарушения дыхания, поднимается температура, появляется кашель с гнойной мокротой) необходимо обратиться к врачу.

Безопасность применения у пациентов с заболеваниями почек и/или печени не установлена, данным пациентам необходимо назначать лекарственное средство с осторожностью.

В одной разовой дозе 5 мл содержится 4,1 г фруктозы, в разовой дозе 10 мл содержится 8,2 г фруктозы, в дозе 15 мл содержится 12,3 г фруктозы. Данное количество фруктозы следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Применение в период беременности или кормления грудью. Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Способность влиять на быстроту реакции при вождении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не следует принимать одновременно с лекарственными средствами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства. Может уменьшиться всасывание других лекарственных средств, принимаемых одновременно. В качестве меры предосторожности лекарственное средство Алтей не следует принимать за 0,5 часа – 1 час до или после приема других лекарственных средств.

Условия хранения и срок годности.

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать в течение 10 суток после вскрытия бутылки.

Срок годности 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек.

Без рецепта врача.

Форма выпуска.

Сироп по 200 мл в бутылках из полиэтилентерефталата, упакованных вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Информация о производителе.

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь