



Инструкция по медицинскому применению (информация для специалиста)

ТРАВИСИЛ TRAVISIL

Общая характеристика.

Международное непатентованное название.-----

Описание. *Гранулы со вкусом имбиря:* неоднородная смесь порошка и мелких гранул от светло-коричневого до темно-коричневато-желтого цвета с запахом имбиря. *Гранулы со вкусом лимона:* неоднородная смесь порошка и мелких гранул от светло-коричневого до темно-коричневато-желтого цвета с запахом лимона. При растворении гранул в воде образуется раствор от светло-желтого до темно-коричневато-желтого цвета с нерастворенными частицами.

Состав.

Каждый пакет содержит:

Перца черного плодов экстракт сухой (10:1)	10 мг
Куркумы длинной корневищ экстракт сухой (10:1)	12,5 мг
Имбиря лекарственного корневищ экстракт сухой (18:1)	15 мг
Солодки голой корней экстракт сухой (3,5:1)	50 мг

Экстрагент - вода.

Вспомогательные вещества:

Трависил, гранулы со вкусом имбиря – изомальт (E953), левоментол, ацесульфам калия (E950), порошок натурального имбиря, ароматизатор имбирь;

Трависил, гранулы со вкусом лимона – изомальт (E953), левоментол, ацесульфам калия (E950), трусил лимон, трусил лимон лайм, ароматизатор лимон.

Форма выпуска. Гранулы со вкусом имбиря, лимона.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства в комбинации. Код АТХ: R05CA10.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Трависил, гранулы являются аюрведическим средством. Оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и муколитическое действие. Используется для симптоматического лечения заболеваний органов дыхания, сопровождающихся кашлем.

Фармакокинетика. Механизм действия не установлен. Данные о фармакологических и фармакокинетических параметрах отсутствуют.

Показания к применению. В качестве симптоматического средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозировка.

Взрослым – по 1 пакету, растворенному в 125-250 мл горячей воды, 3-4 раза в день. Приготовленный раствор выпить медленно в теплом виде.

Лекарственное средство принимают внутрь после приготовления, раствор хранению не подлежит.

Курс лечения не должен превышать 2 недели.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Пациенты с нарушением функции почек.

Лекарственное средство не рекомендовано пациентам с заболеваниями почек (см. раздел «Меры предосторожности»).

Пациенты с нарушением функции печени.

Лекарственное средство не рекомендовано пациентам с заболеваниями печени (см. раздел «Противопоказания»).

Применение у детей. Лекарственное средство не рекомендовано для детей и подростков до 18 лет.

Применение при беременности и лактации. Препарат не следует применять при беременности и в период лактации в связи с отсутствием достаточных данных.

Меры предосторожности. Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развиваются нарушения дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Препараты солодки не рекомендуется принимать пациентам с артериальной гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипокалиемией, заболеваниями почек и печени, так как данные пациенты более предрасположены к неблагоприятным последствиям приема солодки.

Пациентам, принимающим корень солодки, не следует принимать другие средства, содержащие солодку, из-за риска развития серьезных побочных реакций, таких как, задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма.

Побочные действия. Возможны аллергические реакции.

Возможно развитие расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта: дискомфорт в области желудка, сухость во рту, отрыжка, диспепсия, тошнота, метеоризм.

При возникновении указанных расстройств или появлении других, не перечисленных в данной инструкции симптомов необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Обструкция желчевыводящих путей, холангит, заболевания печени, желчнокаменная болезнь.

Беременность, период лактации.

Детский возраст до 18 лет.

Передозировка. До настоящего времени о случаях передозировки лекарственного средства Трависил, гранулы не сообщалось.

Симптомами передозировки корня солодки являются задержка жидкости в организме, гипокалиемия, артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая энцефалопатия.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется одновременный приём с противокашлевыми лекарственными средствами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Корень солодки, входящий в состав лекарственного средства, может препятствовать действию антигипертензивных средств.

При одновременном применении с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, кортикостероидами и слабительными средствами возможно усиление гипокалиемии, совместный прием с данными средствами не рекомендован.

<p style="text-align: center;">СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p>

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования по оценке влияния приема лекарственного средства на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

Условия хранения и срок годности. В защищенном от света и влаги месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска. Без рецепта врача.

Упаковка. По 5,0 г в пакетах по 5 штук или по 10 штук вместе с листком-вкладышем помещают во вторичную упаковку (пачку из картона коробочного).

Информация о производителях.

Произведено:

Плетхико Фармасьютикалз Лтд.,

Дхаравара, Калария – 453 001, Индор (М.П.), Индия.

Расфасовано и упаковано:

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,

225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

