

К № 5-05 06.06.16

Инструкция по медицинскому применению (информация для специалиста)

ТРАВИСИЛ TRAVISIL

Общая характеристика. Описание. *Таблетки с ароматом и вкусом апельсина:* овальные полупрозрачные таблетки двояковыпуклой формы, оранжевого цвета, имеющие апельсиновый аромат.

Таблетки с ароматом и вкусом клубники: овальные полупрозрачные таблетки двояковыпуклой формы, от светло-розового до коричневатого-розового цвета, имеющие клубничный аромат.

Таблетки с ароматом и вкусом лимона: овальные полупрозрачные таблетки двояковыпуклой формы, желтого цвета, имеющие лимонный аромат.

Таблетки с ароматом и вкусом мяты: овальные полупрозрачные таблетки двояковыпуклой формы, зеленого цвета, имеющие мятный аромат.

Таблетки с ароматом и вкусом черной смородины: овальные полупрозрачные таблетки двояковыпуклой формы, синевато-фиолетового цвета, имеющие аромат черной смородины.

Таблетки со всеми вкусами и ароматами имеют слегка неровную шероховатую поверхность. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе, неровность краев. Возможно появление белого налета (опудривания) или легкое прилипание таблеток к внутренней стороне первичной упаковки.

Состав.

Каждая таблетка содержит:

Юстиции адатоды листьев экстракт сухой (5:1) (<i>Justicia adhatoda</i> , сем. Акантовых- <i>Acanthaceae</i>)	3,25 мг
Перца длинного плодов экстракт сухой (4:1) (<i>Piper longum</i> , сем. Перцевых - <i>Piperaceae</i>)	16,14 мг
Перца черного плодов экстракт сухой (6:1) (<i>Piper nigrum</i> сем. Перцевых- <i>Piperaceae</i>)	12,91 мг
Имбиря лекарственного корневищ экстракт сухой (15:1) (<i>Zingiber officinale</i> , сем. Имбирных - <i>Zingiberaceae</i>)	7,74 мг
Солодки голой корней экстракт сухой (5:1) (<i>Glycyrrhiza glabra</i> L., сем. Бобовых - <i>Fabaceae</i>)	6,45 мг
Эмблики лекарственной плодов экстракт сухой (4:1) (<i>Embllica officinalis</i> , сем. Молочайных - <i>Euphorbiaceae</i>)	10,33 мг
Куркумы длинной корневищ экстракт сухой (7:1) (<i>Curcuma longa</i> , сем. Имбирных - <i>Zingiberaceae</i>)	9,69 мг
Акации катеху коры экстракт сухой (6:1) (<i>Acacia catechu</i> , сем Мимозовых - <i>Mimosoideae</i>)	10,98 мг

Фенхеля обыкновенного плодов экстракт сухой (7:1) (<i>Foeniculum vulgare</i> , сем. Зонтичных - <i>Ariaceae</i>)	11,62 мг
Базилка священного листьев, корней, семян экстракт сухой (<i>Ocimum sanctum</i> L., сем. Губоцветные - <i>Labiatae</i>) (5:1)	3,22 мг
Терминалии чебулы плодов экстракт сухой (4:1) (<i>Terminalia chebula</i> , сем. Комбретовых - <i>Combretaceae</i>)	3,22 мг
Терминалии беллерика плодов экстракт сухой (4:1) (<i>Terminalia belerica</i> , сем. Комбретовых - <i>Combretaceae</i>)	3,22 мг
Альпинии лекарственной корневищ экстракт сухой (10:1) (<i>Alpinia officinarum</i> , сем. Имбирных - <i>Zingiberaceae</i>)	12,91 мг
Абруса молитвенного листьев экстракт сухой (10:1) (<i>Abrus precatorius</i> , сем. Бобовых - <i>Fabaceae</i>)	12,91 мг

Вспомогательные ингредиенты: изомальт-основа (основа без сахара); ментол; ацесульфам калия (E 950); Трависил, таблетки с ароматом и вкусом апельсина – кармуазин (E 122), сансет желтый (E 110), апельсина масло; Трависил, таблетки с ароматом и вкусом клубники – кармуазин (E 122), ароматизатор клубничный; Трависил, таблетки с ароматом и вкусом лимона – хинолиновый желтый (E 104), лимона масло; Трависил, таблетки с ароматом и вкусом мяты – хинолиновый желтый (E 104), бриллиантовый голубой (E 133), мятное масло; Трависил, таблетки с ароматом и вкусом черной смородины – кармуазин (E 122), бриллиантовый голубой (E 133), ароматизатор черносмородиновый.

Примечание

Экстракцию осуществляют с помощью очищенной воды. Органические растворители в производстве препарата не используются.

Форма выпуска. Таблетки для рассасывания (без сахара) с ароматом и вкусом апельсина, с ароматом и вкусом клубники, с ароматом и вкусом лимона, с ароматом и вкусом мяты и с ароматом и вкусом черной смородины.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства в комбинации. Код АТХ: R05CA10.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика:

Трависил (таблетки для рассасывания) являются аюрведическим средством. Оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и муколитическое действие. Традиционно используется для симптоматического лечения заболеваний органов дыхания, сопровождающихся кашлем.

Фармакокинетика:

Механизм действия не установлен. Определение дозоспецифических эффектов, фармакодинамических и фармакокинетических параметров аюрведических средств невозможно.

Показания к применению.

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозировка.

Таблетки рассасываются в полости рта.


Взрослым лекарственное средство назначают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Курс лечения до 2-х недель.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Пациенты с нарушением функции почек и/или печени. Лекарственное средство не рекомендовано пациентам с нарушением функции почек и/или печени тяжелой степени.

Применение у детей. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Трависил у детей до 18 лет не установлены. Ввиду недостатка данных не рекомендовано принимать препарат детям и подросткам до 18 лет.



Побочные действия.

Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Детский возраст до 18 лет.

Передозировка.

До настоящего времени о случаях передозировки лекарственного средства Трависил таблетки не сообщалось.

Меры предосторожности.

С осторожностью применять у пациентов с повышенным риском кровотечений, желчнокаменной болезнью, холангитом, заболеваниями почек и/или печени, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипокалиемией.

Если во время приема лекарственного средства симптомы заболевания сохраняются или происходит ухудшение состояния (развивается нарушение дыхания, повышается температура, появляется кашель с гнойной мокротой), необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не рекомендуется одновременный приём с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

Применение при беременности и кормлении грудью.

Препарат не рекомендуется применять при беременности и в период лактации в связи с отсутствием клинических данных.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с опасными механизмами.

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения и срок годности.

В защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности - 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска.

Без рецепта врача.

Упаковка. По 6 таблеток в блистере из ПВХ/алюминия. По 2 блистера с листком-вкладышем в пачке из картона коробочного.

Информация о производителях.

Произведено и расфасовано:

Плетхико Фармасьютикалз Лтд., Индия

Дхаравара, Калария – 453001, Индор (М.П.) Индия.

Упаковано:

ОАО «Экзон», Республика Беларусь,

225612, Брестская обл., г. Дрогичин, ул. Ленина, 202.

